



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গবেষণা উইং
গাজীপুর-১৭০১

কৃষিই সমৃদ্ধি

Fax No. : 88-02-49270027
Office Ph: 88-02-49270001
PABX : 02-49270041-8
Email : dir.res@bari.gov.bd
Web : www.bari.gov.bd

শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশাছন্ন আবহাওয়ায় সরিষা চাষীদের করণীয়

শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশাছন্ন মেঘলা আকাশ হলে সরিষার পাতা ঝলসানো রোগের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে। তাই:

- সরিষার চারা অবস্থা বা গাছের বয়স ২৫-৩০ দিন হলে অর্থাৎ ফুল আসার আগে ইপ্রোডিয়ন গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১ বার স্প্রে করতে হবে।
- অথবা ফুল শেষ হবার সাথে সাথেই একই গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা ডাইফেনোকোনাজল + এ্যাজোক্সিস্ট্রিবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার সমস্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।

২৬/১২/২৪

পরিচালক (গবেষণা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জরদেবপুর, গাজীপুর